

# Comment déclencher le protocole d'antalgie applicable par l'IDE 1 fois



## Référence blue medi :

*Soins / Protocole / 491 V1*

Patients hospitalisés dans un service ayant Easily  
Protocoles transitoires d'un antalgique applicable  
par IDE une fois


### EN CAS DE PROBLÈME SUR EASILY :




# Comment appliquer le protocole transitoire d'une antalgie en une fois

Application 1/5

1 Dans le dossier du patient cliquer sur



2 cliquer sur AJOUTER



# Comment appliquer le protocole transitoire d'une antalgie en une fois

## Application 2/5

3

1. Cliquer sur protocole
2. Saisir le nom du protocole
3. Cliquer sur rechercher

Données Patient Communes

Poids : 60 kg (il y a 3 sem.)

Taille : cm

IMC : m<sup>2</sup>

SC : m<sup>2</sup>

Créat : μmol/l

Protocole Medicament Soins et Actes médicaux Equipement Biologie Imagerie Transfusion (site pilote)

IDE paracetamol 1gr

Rechercher

Recherche avancée

Le protocole apparait

4

- Double cliquer sur le nom du protocole
- Choisir le bon protocole en fonction du poids du patient.

TEST EASILY TROIS Uf test né TEST EASILY TROIS

né le 01/09/1976 (44 ans et 7 mois) - IPP : 030072069

Post-it Agenda Antécédents Rech. Clin. Plus ...

Protocole Medicament Soins et Actes médicaux Equipement Biologie Imagerie Transfusion (site pilote)

IDE paracetamol

Rechercher

Recherche avancée

FAVORIS >

Protocoles institutionnels

IDE Paracétamol 1 gr PO 1 fois patient > 50 kg

Protocole thérapeutique (V1)

Mots clefs : doliprane, paracetamol, dafalgan, efferalgan

1 - 1 sur 1 protocoles

# Comment appliquer le protocole transitoire d'une antalgie en une fois

## Application 3/5

- 5 1. Consulter les consignes
2. Valider et fermer

**Le protocole apparaît.**

**1**

**2**

**Valider et fermer**

**6**

**Signer**

Attention ! Une signature est requise.

Tout	Médicaments	Soins et Actes médicaux	Prescription	Posologie	Durée
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Paracétamol 500 mg comprimé orodispersible - voie ORALE	2 comprimés 1 fois/jour (S)	pendant 1 jour à partir du 14/04/2021
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Check-list protocole IDE Paracétamol	1 fois/jour (S)	pendant 1 jour à partir du 14/04/2021

# Comment appliquer le protocole transitoire d'une antalgie en une fois

## Application 4/5

**7** Vérifier l'absence de redondance ou contre indication au paracétamol

Signature de l'ensemble de la prescription

Attention, vous

Erreurs de doses

Médicaments

PSE - Héparine sodique 5000 UI/ml solution injectable Le débit pr

PSE - HEPARINE NA PAN 25000UI/5ML INJ FL Le débit pr

Redondances

Médicaments

Héparine sodique 5000 UI/ml solution injectable Redondance

HEPARINE NA PAN 25000UI/5ML INJ FL

Utilisateur : forcont58 Mot de passe : [masqué]

Annuler Valider à signer : Tout

Résumé des lignes contrôlées

Valider

**8** Cliquez alors sur

Valider

Signature de la prescription effectuée avec succès.

Tout Médicaments Soins et Actes médicaux

IDE PARACÉTAMOL 1 GR PO 1 FOIS PATIENT > 50 KG

Prescription	Posologie	Durée	Alertes
Paracétamol 500 mg comprimé orodispersible - voie ORALE	2 comprimés 1 fois/jour SI	pendant 1 jour à partir du 14/04/2021 12:00	[?] P
Check-list protocole IDE Paracétamol	1 fois/jour SI	pendant 1 jour à partir du 14/04/2021 12:00	[?] P

Données Patient Communes

Poids : kg

Taille : cm

IMC :

SC : m<sup>2</sup>

Créat : μmol/l

Editer

Etat de la prescription

Signée le 14/04/2021 11:57 par Docteur Burdy Gaelle UF médicale TEST99 SERVICE DE TEST UF d'hébergement TEST99 SERVICE DE TEST

Ajouter Arrêter tout Signer Ordonnance Pancarte Synthèse des alertes Biologie

easily@ HCL

Signer

**9** Vérifier que le bouton soit en bleu

Signer

**10** Cliquer sur

Pancarte

## Application 5/5




**Vous devez tracer les éléments du soin :**

- « Check list protocole IDE paracétamol »



**Si les conditions sont remplies**

- Administrer le médicament
- Tracer comme administrer



Pancarte

Patient : TEST SOPRA Intervenant : Burdy Gaelle Venue : 200113037

**Nouvelle(s) ligne(s) prescrite(s)**

Affichage 24h **Jour** Nuit Jour entier J-2->J0 Impression Perso. Tous les statuts

Validation en un clic

Vue groupée

Sortie

Veillez sélectionner une ou plusieurs vues Jour J

Veillez sélectionner un ou plusieurs filtre voies Filtrer

Masquer paramètres

Créer une intervention

	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h
<b>Médicament</b>												
ORALE Paracétamol 500 mg												
<b>Soins et actes médicaux</b>												
Réfection pansement ...												
Réfection du lit												
<b>Surveillance</b>												
Evaluation risque d'e...												
Toilette												
Check-list protocole I...												

MER 14

## RAPPEL



L'IDE qui applique ce protocole doit ensuite en informer le médecin en charge du patient, afin qu'il prescrive une stratégie médicamenteuse ou non médicamenteuse de prise en charge de la douleur.