



**Arrêt des soins ➔ mutation
d'un patient en réanimation**

EN CAS DE PROBLÈME SUR EASILY :



Mutation d'un patient en réanimation



L'arrêt des soins est **obligatoire** dans la pancarte du patient lors d'une mutation en réanimation.



Cette action est à faire par l'IDE responsable du patient.

Procédure en 4 étapes :

1. Cocher chaque case présente devant les soins
2. Cliquer sur le logo représentant une poubelle
3. Sélectionner "Arrêt immédiat"
4. Valider

Rôle propre

ARRÊT D'INTERVENTION EN RÔLE PROPRE

3 Arrêt immédiat

Arrêt à partir du 01/03/2021 15:05

4 **Valider** Annuler

2 Créer une intervention

1 Age corrigé

1 **GS** PME Néonatal IDE - Schéma de b

Type de têtee:

NN Vérification identité

Coloration

Position nouveau-né

EDIN Total Score

L'arrêt des soins est visible dans la pancarte sous la forme de case hachurée en rouge :

<input type="checkbox"/> Type de têtee:								
<input type="checkbox"/> NN Vérification identité								
<input type="checkbox"/> Coloration								
<input type="checkbox"/> Position nouveau-né								
<input type="checkbox"/> EDIN Total Score								



L'arrêt des prescriptions médicales est automatique.